

## **TERMINAÇÃO INTENSIVA A PASTO GANHO EM CARÇAÇA COM NUCLEMIX CONNAN TERMINA-FÁCIL**

O período das chuvas proporciona a fase de maior potencial produtivo das nossas pastagens tropicais e conseqüentemente à maior facilidade para engorda dos animais. Porém, as melhores oportunidades de remuneração da arroba normalmente ocorrem no período seco, quando há maior déficit de abate. Dessa forma, qual a melhor estratégia nutricional para a terminação no período seco?

Uma das alternativas seguras para acabamento dos animais no período seco é a terminação em confinamento tradicional. Contudo, o custo estrutural do sistema é alto e arriscado. Além disso, sem uma demanda constante de animais, a estrutura fica ociosa durante uma parte do ano, gerando alto desembolso operacional.

Outra alternativa prática, segura e de baixo investimento estrutural é a terminação intensiva a pasto com Nuclemix Connan Termina-Fácil. O Nuclemix Connan Termina-Fácil é um núcleo completo com minerais, proteínas e uma combinação de aditivos para ser misturado com farelos energéticos na proporção de 15:85.

O tratamento dos animais com Nuclemix Connan Termina-Fácil permite a deposição de gordura de acabamento e aumento do ganho em carcaça em qualquer época do ano, sem a necessidade de se fechar os animais em confinamento, economizando em estrutura e mão de obra, sendo uma tecnologia acessível a todos os pecuaristas.

O sistema de terminação intensiva a pasto foi testado em trabalho realizado na Apta – Colina em parceria com a Connan, onde a terminação com Nuclemix Connan Termina-Fácil foi comparada com a suplementação proteica-energética ao nível de 0,5% do peso vivo (Tabela 1).

**Tabela 1.** Desempenho de bovinos Nelore inteiros submetidos à suplementação proteica-energética (0,5% do PV) X Nuclemix Connan Termina-Fácil (2% do PV) no período de junho a setembro de 2012.

Resultados	Suplem. Proteica-energética (0,5% do PV)	Connan Termina- Fácil (2% do PV)
Período de Tratamento (dias)	89	89
Peso Vivo Médio Inicial (kg)	480	480
Peso Vivo Médio Final (kg)	528	614
GMD (kg)	0,534	1,505
Peso da Carcaça no abate (kg)	284	361
Ganho em Carcaça no período (kg)	25,2	101,2
GMD de carcaça (kg)	0,285	1,136
Espessura de gordura (mm)	1,8	3,5
Rendimento de ganho (%)	53,3	75,5

Fonte: Alves Neto, J.A. (2014).

Neste trabalho constatou-se a grande superioridade do Nuclemix Connan Termina-Fácil, pois os animais ganharam mais peso e mais carcaça, apresentando rendimento de ganho em torno de 75%, ou seja, de cada kg de peso vivo ganho pelos animais, 750 g foi em carcaça! A figura 1 ilustra dois animais que participaram do experimento. Repare a diferença de acabamento e no “vazio” dos animais.



**Figura 1.** Animais utilizados no experimento na Apta – Colina. Animal **A** tratado com Connan Termina-Fácil (2% do PV) e animal **B** tratado com suplemento proteico-energético (0,5% do peso vivo) no período seco.

O fato é que a suplementação proteica-energética de até 0,5% do peso vivo não permite que os animais fiquem com uma boa espessura de gordura, ou seja, os animais ficam pesados, mas não acabados, pois o ganho depende muito da oferta e qualidade da forragem. Em contrapartida, os animais Nelore inteiros tratados com Nuclémix Connan Termina-Fácil atingem o nível mínimo de gordura exigido, ficando pesados e acabados (figura 2).



**Figura 2.** Carcaça dos animais utilizados no experimento na Apta – Colina. Animal **A** tratado com Nuclémix Connan Termina-Fácil (2% do PV) e animal **B** tratado com suplemento proteico-energético (0,5% do peso vivo) no período seco.

Já são mais de 60 mil animais tratados no sistema de terminação intensiva a pasto com Nuclémix Connan Termina-Fácil. Alguns resultados de campo estão detalhados na tabela 2.

**Tabela 2.** Resultados de campo do Nuclémix Connan Termina-Fácil.

Resultados	1	2	3	4	5
Número de Animais	54	54	96	120	51
Período de Tratamento (dias)	79	91	91	89	90
Peso Vivo Médio Inicial	436	414	430	423	473,65
Peso da Carcaça Inicial (kg)	222,6	207	215	211,5	241,6
Peso Vivo Médio Final (kg)	530	546	564,2	550,2	564,25
Peso da Carcaça Final (kg)	302,8	308,6	317,45	307,43	327,7
Total de @ Produzidas (@)	5,35	6,77	6,83	6,4	5,74
<b>GMD de Carcaça (kg/dia)</b>	<b>1,016</b>	<b>1,116</b>	<b>1,126</b>	<b>1,078</b>	<b>0,957</b>
Custo da @ Engordada (R\$/@)	104,01	96,02	103,53	83,16	103,43

Resultados 1, 2 e 3 – Fazenda Serra do Ouro, Proprietário Ademir João da Cruz (Rondônia); Resultados 4 e 5 – Fazenda Paraíso dos Macacos, Proprietário Turibio Odilon Ribeiro (Rondônia).

O Nuclémix Connan Termina-Fácil é uma tecnologia simples e acessível que permite ótimos ganhos em carcaça e de rentabilidade na terminação dos animais durante o período seco.

## COMO FAZER?

O Nuclémix Connan Termina-Fácil deve ser diluído com farelos energéticos na proporção de 15:85. A mistura deve ser ofertada ao nível de 2% do peso vivo diariamente seguindo o seguinte esquema de adaptação:

- ✓ Dias 1 a 7 – fornecer 0,5% PV da mistura;
- ✓ Dias 8 a 14 – fornecer 1% PV da mistura;
- ✓ Dias 15 a 21 – fornecer 1,5% PV da mistura;
- ✓ Dia 22 até o abate – fornecer 2,0% PV da mistura;

O fornecimento deve ser diário (1 ou 2 tratos), e caso ocorra alguma interrupção os animais deverão passar por nova adaptação. Recomenda-se que o pasto possua boa oferta de forragem (2000 kg MS/ha) no início do tratamento, com lotação máxima de 6 UA/ha. Utilizar no mínimo 40% de milho moído na mistura. O período mínimo de tratamento recomendado é de 60 dias para animais com boa condição corporal no início do manejo, ou conforme recomendação técnica. Disponibilizar 40 a 50 cm lineares de cocho por cabeça. Para mais informações consulte um técnico Connan.